

# Puffin

---

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Light     | <i>Light Italic</i>            |
| Regular   | <i>Regular Italic</i>          |
| Medium    | <i>Medium Italic</i>           |
| SemiBold  | <b><i>SemiBold Italic</i></b>  |
| Bold      | <b><i>Bold Italic</i></b>      |
| ExtraBold | <b><i>ExtraBold Italic</i></b> |
| Black     | <b><i>Black Italic</i></b>     |

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Display Light     | <i>Display Light Italic</i>            |
| Display Regular   | <i>Display Regular Italic</i>          |
| Display Medium    | <i>Display Medium Italic</i>           |
| Display SemiBold  | <b><i>Display SemiBold Italic</i></b>  |
| Display Bold      | <b><i>Display Bold Italic</i></b>      |
| Display ExtraBold | <b><i>Display ExtraBold Italic</i></b> |
| Display Black     | <b><i>Display Black Italic</i></b>     |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Display Soft Light     | <i>Display Soft Light Italic</i>            |
| Display Soft Regular   | <i>Display Soft Regular Italic</i>          |
| Display Soft Medium    | <i>Display Soft Medium Italic</i>           |
| Display Soft SemiBold  | <b><i>Display Soft SemiBold Italic</i></b>  |
| Display Soft Bold      | <b><i>Display Soft Bold Italic</i></b>      |
| Display Soft ExtraBold | <b><i>Display Soft ExtraBold Italic</i></b> |
| Display Soft Black     | <b><i>Display Soft Black Italic</i></b>     |

---

**DESIGNER**  
**PIETER VAN ROSMALEN**

**DESIGN YEAR**  
**2008 – 2020**

---

## ABOUT

You may recall a charming bold and round display sans called Pinup by Pieter van Rosmalen among the first batch of Bold Monday releases. Informal and of friendly nature, but consisting of one style only. More than 10 years later it grew into two comprehensive type series – one very practical and still fun, one very fun and still quite practical: Puffin and Puffin Arcade.

The extended “normal” family consists of Puffin, Puffin Display and Puffin Display Soft, each available in seven weights plus italics. Plain Puffin is the most tamed member. A versatile humanist sans with generous spacing and pronouncedly oblique italics (15°) that is well-suited for on-screen reading and user interface design. Capital I, lowercase l and the numeral 1 have unique forms so they are not easily confused.

Puffin Display and Puffin Display Soft, in comparison, are more flavourful: distinctly curved letterforms, especially in the swinging true italics, or rounded terminals in Puffin Display Soft make you feel right at home and on first-name-terms with it. The Display styles have a taller x-height and slightly tighter spacing that fit all kinds of personable applications in medium to large font sizes. And for an extra dose of playfulness – be it in posters or video games – combine them with Puffin Arcade.

---

## SUPPORTED LANGUAGES

Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Bosnian, Catalan, Chiga, Colognian, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, Ganda, German, Gusii, Hungarian, Icelandic, Inari Sami, Indonesian, Irish, Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalaallisut, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Latvian, Lithuanian, Lower Sorbian, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Maltese, Manx, Meru, Morisyen, North Ndebele, Northern Sami, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Polish, Portuguese, Romanian, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Turkmen, Upper Sorbian, Vunjo, Walser, Welsh and Zulu.

---

***Mathurin Jacques Brisso***

par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouin

***Kolonien an Steilküsten***

PAPEGAAIDUIKER

La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres

*até 400 batimentos por minuto*

**tollazatuk tömött**

Elófordulásuk

***Atlantik martısı***

De har små och spetsiga vingar och en kort stjärt

*ušechny druhy papuchalků*

**pelagic seabirds**

*þeir verpa aðeins einu egg\**

PUFFIN DISPLAY LIGHT 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten

PUFFIN DISPLAY LIGHT 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

PUFFIN DISPLAY LIGHT 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a

PUFFIN DISPLAY LIGHT ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden.*

PUFFIN DISPLAY LIGHT ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een*

PUFFIN DISPLAY LIGHT ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por*

PUFFIN DISPLAY REGULAR 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten

PUFFIN DISPLAY REGULAR 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de

PUFFIN DISPLAY REGULAR 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo

PUFFIN DISPLAY ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden.*

PUFFIN DISPLAY ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de*

PUFFIN DISPLAY ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400*

PUFFIN DISPLAY MEDIUM 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in

PUFFIN DISPLAY MEDIUM 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie

PUFFIN DISPLAY MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,

PUFFIN DISPLAY MEDIUM ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im*

PUFFIN DISPLAY MEDIUM ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker,*

PUFFIN DISPLAY MEDIUM ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até*

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD 44/48 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten**

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen*

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker,*

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo*

PUFFIN DISPLAY BOLD 44/48 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten**

PUFFIN DISPLAY BOLD 26/28 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de**

PUFFIN DISPLAY BOLD 16/20 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaai-duiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no**

PUFFIN DISPLAY BOLD ITALIC 44/48 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten***

PUFFIN DISPLAY BOLD ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de***

PUFFIN DISPLAY BOLD ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo***

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD 44/48 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen**

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD 26/28 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft**

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD 16/20 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaai-duiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no**

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD ITALIC 44/48 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in***

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft***

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,***

PUFFIN DISPLAY BLACK 44/48 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf**

PUFFIN DISPLAY BLACK 26/28 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de**

PUFFIN DISPLAY BLACK 16/20 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban**

PUFFIN DISPLAY BLACK ITALIC 44/48 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in***

PUFFIN DISPLAY BLACK ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de***

PUFFIN DISPLAY BLACK ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores:***

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft*

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een*

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto.*

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo

PUFFIN DISPLAY SOFT ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden.*

PUFFIN DISPLAY SOFT ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de*

PUFFIN DISPLAY SOFT ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até*

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im*

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker,*

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400*

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD 44/48 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD ITALIC 44/48 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im*

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker,*

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo*

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD 44/48 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten**

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD 26/28 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de**

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD 16/20 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaai-duiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no**

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD ITALIC 44/48 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter***

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische*

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo*

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD 44/48 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen**

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD 26/28 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de**

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD 16/20 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no**

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD ITALIC 44/48 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in***

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de***

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,***

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK 44/48 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf**

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK 26/28 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In**

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK 16/20 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban**

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK ITALIC 44/48 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in***

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de***

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores:***

PUFFIN LIGHT 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de

PUFFIN LIGHT 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo

PUFFIN LIGHT ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de*

PUFFIN LIGHT ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo*

## PUFFIN LIGHT 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban am-

## PUFFIN LIGHT 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

## PUFFIN LIGHT 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró tollazatok tömött, durva és lesimuló, alul prémszerű. Peir verpa

## PUFFIN LIGHT ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban am-*

## PUFFIN LIGHT ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas*

## PUFFIN LIGHT ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró tollazatok tömött, durva és lesimuló, alul prémszerű. Peir verpa*

PUFFIN REGULAR 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de

PUFFIN REGULAR 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,

PUFFIN ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de*

PUFFIN ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vô,*

## PUFFIN REGULAR 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban

## PUFFIN REGULAR 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as

## PUFFIN REGULAR 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró tollazatuk tömött,

## PUFFIN ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban*

## PUFFIN ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as*

## PUFFIN ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró tollazatuk tömött,*

PUFFIN MEDIUM 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de

PUFFIN MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando

PUFFIN MEDIUM ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de*

PUFFIN MEDIUM ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando*

## PUFFIN MEDIUM 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incu-

## PUFFIN MEDIUM 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a

## PUFFIN MEDIUM 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró tollazatuk

## PUFFIN MEDIUM ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incu-*

## PUFFIN MEDIUM ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a*

## PUFFIN MEDIUM ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró tollazatuk*

PUFFIN SEMIBOLD 26/28 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de

PUFFIN SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus

PUFFIN SEMIBOLD ITALIC 26/28 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de*

PUFFIN SEMIBOLD ITALIC 16/20 PT

*The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus*

## PUFFIN SEMIBOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un

## PUFFIN SEMIBOLD 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo

## PUFFIN SEMIBOLD 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötte rövid. Apró tollazatuk

## PUFFIN SEMIBOLD ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un*

## PUFFIN SEMIBOLD ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo*

## PUFFIN SEMIBOLD ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötte rövid. Apró tollazatuk*

PUFFIN BOLD 26/28 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de**

PUFFIN BOLD 16/20 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus**

PUFFIN BOLD ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de***

PUFFIN BOLD ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus***

PUFFIN BOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un

PUFFIN BOLD 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,

PUFFIN BOLD 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró

PUFFIN BOLD ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un*

PUFFIN BOLD ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo,*

PUFFIN BOLD ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötté rövid. Apró*

PUFFIN EXTRABOLD 26/28 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de**

PUFFIN EXTRABOLD 16/20 PT

**The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres.**

PUFFIN EXTRABOLD ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de***

PUFFIN EXTRABOLD ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres.***

PUFFIN EXTRABOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo

PUFFIN EXTRABOLD 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando

PUFFIN EXTRABOLD 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek,

PUFFIN EXTRABOLD ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo*

PUFFIN EXTRABOLD ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando*

PUFFIN EXTRABOLD ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek,*

PUFFIN BLACK 26/28 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden.**

PUFFIN BLACK 16/20 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban**

PUFFIN BLACK ITALIC 26/28 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden.***

PUFFIN BLACK ITALIC 16/20 PT

***The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban***

PUFFIN BLACK 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja

PUFFIN BLACK 9/12 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando

PUFFIN BLACK 6/10 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek,

PUFFIN BLACK ITALIC 12/15 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja*

PUFFIN BLACK ITALIC 9/12 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando*

PUFFIN BLACK ITALIC 6/10 PT

*The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek,*

PUFFIN DISPLAY LIGHT + REGULAR 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist **Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY LIGHT + MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY LIGHT + SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY REGULAR + MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'au-

PUFFIN DISPLAY REGULAR + SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY REGULAR + BOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY LIGHT ITALIC + ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY LIGHT ITALIC + MEDIUM ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY LIGHT ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY ITALIC + MEDIUM ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist **Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY ITALIC + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY MEDIUM + SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY MEDIUM + BOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY MEDIUM + EXTRABOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD + BOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD + EXTRABOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD + BLACK 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m

PUFFIN DISPLAY MEDIUM ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD ITALIC + BOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY MEDIUM ITALIC + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD ITALIC + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY MEDIUM ITALIC + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD ITALIC + BLACK ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT + REGULAR 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT + MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT + SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR + MEDIUM 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'au-

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR + SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR + BOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT ITALIC + ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY SOFT ITALIC + MEDIUM ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT ITALIC + MEDIUM ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY SOFT ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY SOFT ITALIC + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils vo-  
lent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM + SEMIBOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM + BOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM + EXTRABOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD + BOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD + EXTRABOLD 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD + BLACK 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM ITALIC + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM ITALIC + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD ITALIC + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY SOFT S.BOLD ITALIC + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY SOFT S.BOLD ITALIC + BLACK ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres

## PUFFIN LIGHT + REGULAR 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de

## PUFFIN LIGHT + MEDIUM 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de

## PUFFIN LIGHT + SEMIBOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de

## PUFFIN REGULAR + MEDIUM 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar

## PUFFIN REGULAR + SEMIBOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar

## PUFFIN REGULAR + BOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar

## PUFFIN LIGHT ITALIC + REGULAR ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de

## PUFFIN LIGHT ITALIC + MEDIUM ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de

## PUFFIN LIGHT ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de

## PUFFIN ITALIC + MEDIUM ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar

## PUFFIN ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar

## PUFFIN ITALIC + BOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar

## PUFFIN MEDIUM + SEMIBOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Pa-

## PUFFIN MEDIUM + BOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

## PUFFIN MEDIUM + EXTRABOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

## PUFFIN SEMIBOLD + BOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

## PUFFIN SEMIBOLD + EXTRABOLD 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

## PUFFIN SEMIBOLD + BLACK 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent **relativement haut au-dessus de l'eau**, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an **Steilküsten oder auf küstennahen Inseln**, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische

PUFFIN MEDIUM ITALIC + SEMIBOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. *Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Pa-*

PUFFIN MEDIUM ITALIC + BOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. *Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische*

PUFFIN MEDIUM ITALIC + EXTRABOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. *Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische*

PUFFIN SEMIBOLD ITALIC + BOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. *Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische*

PUFFIN SEMIBOLD ITALIC + EXTRABOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. *Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische*

PUFFIN SEMIBOLD ITALIC + BLACK ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the **French zoologist Mathurin Jacques Brisson** in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. *Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische*

PUFFIN DISPLAY LIGHT + LIGHT ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French* zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie

PUFFIN DISPLAY REGULAR + ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French* zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins.

PUFFIN DISPLAY MEDIUM + MEDIUM ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French* zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins.

PUFFIN DISPLAY SEMIBOLD + SEMIBOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French* zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-

PUFFIN DISPLAY BOLD + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French* zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'au-

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the *French* zoologist *Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m

PUFFIN DISPLAY BLACK + BLACK ITALIC 16/20 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de *Atlantische Papegaaiduiker*, maar ook de Hebriden zijn een bekend ge-**

PUFFIN DISPLAY SOFT LIGHT + LIGHT ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie

PUFFIN DISPLAY SOFT REGULAR + ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins.

PUFFIN DISPLAY SOFT MEDIUM + MEDIUM ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins.

PUFFIN DISPLAY SOFT SEMIBOLD + SEMIBOLD ITALIC 16/20

**The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralment à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres ping-**

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'au-

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK + BLACK ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de *Atlantische Papegaaiduiker*, maar ook de Hebriden zijn een bekend ge-

PUFFIN DISPLAY MEDIUM + MEDIUM ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins.

PUFFIN DISPLAY EXTRABOLD + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m

PUFFIN DISPLAY SOFT BOLD + BOLD ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'au-

PUFFIN DISPLAY SOFT EXTRABOLD + EXTRABOLD ITALIC 16/20

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m

PUFFIN DISPLAY SOFT BLACK + BLACK ITALIC 16/20 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de *Atlantische Papegaaiduiker*, maar ook de Hebriden zijn een bekend ge-

PUFFIN LIGHT + LIGHT ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de *Atlantische Papegaaiduiker*, maar ook de

PUFFIN REGULAR + ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de *Atlantische Papegaaiduiker*, maar

## PUFFIN MEDIUM + MEDIUM ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Pa-

## PUFFIN SEMIBOLD + SEMIBOLD ITALIC 12/15 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Pa-

## PUFFIN BLACK + BLACK ITALIC 12/15 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de *Atlantische Papegaaiduiker*, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas até 400 batimentos por minuto. Szárnyaik kicsinyek, keskenyek; 16 tollú farkuk fölötte rövid. Apró tollazatuk tömött, *durva és lesimuló, alul prémszerű*. Þeir verpa aðeins einu eggi í holu**

## PUFFIN BOLD + BOLD ITALIC 12/15 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlan-**

## PUFFIN EXTRABOLD + EXTRABOLD ITALIC 12/15 PT

**The genus *Fratercula* was introduced by the *French zoologist Mathurin Jacques Brisson* in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent *relativement haut au-dessus de l'eau*, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an *Steilküsten oder auf küstennahen Inseln*, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de**

---

GLYPH REPERTOIRE — PUFFIN

---

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LATIN LOWERCASE                 | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ ž                                                |
| LATIN LOWERCASE ALTERNATES      | ɑ ɑ̇ â ä ă ǎ ā ą ƒ                                                                                                                                               |
| LATIN LOWERCASE LIGATURES       | fɪ fl                                                                                                                                                            |
| LATIN UPPERCASE                 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Å Ā Ă Ą Ą̃ Ą̇ Ć Č Ď Đ É Ê Ë Ě Ė Ę Ğ Ģ Ĥ Ħ İ Ï Î Ï Ő Ű Ú Ů Ũ Ū Ŭ Ů Ű Ų Ŵ Ŷ Ÿ Ž Ż                            |
| PUNCTUATION AND SPECIAL SYMBOLS | © ® ™   ¡ ¨ – — _ ~ + ± − × = ≠ ≈ ÷ < > ≤ ≥ ! , ; ‘ ’ “ ” „ „ ‹ › » ⁄ \ / ( ) { } [ ] % ‰ ‡ ° * ^ & @ # \$ % £ ¥ ₣ € § ¤ ¶ ∞ μ ∂ Σ Π π ∫ Ω ¬ √ Δ ◇ ← ↑ → ↓ ↖ ↗ ↘ |
| NUMERALS                        | 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ¼ ¾                                                                     |
| ACCENTS                         | ˘ ˇ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˆ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˆ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗                                                                            |

[illegible]

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| CONTEXTUAL ALTERNATES | fb fh fk fi f" ...<br>fb fh fk fi f" ...   |
| ORDINALS              | a o<br><u>a</u> <u>o</u>                   |
| TABULAR NUMERALS      | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| FRACTIONS             | 1/2 1/3 3/4 123/456<br>½ ⅓ ¾ ¹²³⁄₄₅₆       |
| NUMERATORS            | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| DENOMINATORS          | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| SUPERIOR NUMERALS     | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| INFERIORS NUMERALS    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| DOTTED ZERO           | 0<br>0                                     |
| ALTERNATE LOWERCASE A | a á â ã ä å æ ā ą<br>a á â ã ä å æ ā ą     |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONTEXTUAL ALTERNATES | fb fh fk fi f" ...<br>fb fh fk fi f" ...                                   |
| ORDINALS              | a o<br>a o                                                                 |
| TABULAR NUMERALS      | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |
| FRACTIONS             | 1/2 1/3 3/4 123/456<br>1/2 1/3 3/4 123/456                                 |
| NUMERATORS            | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |
| DENOMINATORS          | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |
| SUPERIOR NUMERALS     | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |
| INFERIORS NUMERALS    | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 |
| DOTTED ZERO           | 0<br>0                                                                     |
| ALTERNATE LOWERCASE A | a á â ã ä å æ ç<br>a á â ã ä å æ ç                                         |
| ALTERNATE LOWERCASE G | g ĝ ğ ħ<br>g ĝ ğ ħ                                                         |
| ALTERNATE LOWERCASE Y | y ý ŷ ŷ<br>y ú ü û                                                         |
| ALTERNATE UPPERCASE I | ı İ Ì Í Î Ï Ĳ<br>ı İ Ì Í Î Ï Ĳ                                             |
| ALTERNATE UPPERCASE M | M<br>M                                                                     |
| STRAIGHT ALTERNATES   | A K M Q R V W X Y g k k v w x y ...<br>A K M Q R V W X Y g k k v w x y ... |
| CURLY ALTERNATES      | K Ķ R Ŗ Ř ʀ k ƙ k<br>K Ķ R Ŗ Ř ʀ k ƙ k                                     |